



姿態性低血壓 | 起身不暈指南

從躺、坐到站立時血壓下降，可能頭暈、眼前發黑或跌倒

重點口訣：慢慢起、先坐穩、有症狀立刻坐下或躺下



掃描看電子版

身體可能出現這些訊號



頭暈、眼前發黑
虛弱、站不穩



心悸、視力模糊
甚至昏倒、跌倒

若昏倒、胸痛、呼吸困難、單側無力或說話不清：立即打 119

為什麼會發生？



身體的水分不夠
喝太少、流汗、發燒、拉肚子、出血



藥物引起（最常見）
降血壓藥、利尿劑及部分攝護腺、
心臟、抗憂鬱或安眠藥等



身體反應變慢
年紀大、糖尿病、自律神經或心臟病

※ 吃飽飯後、久站、天氣熱或喝酒後會更明顯

怎樣算姿態性低血壓？

站起來 3 分鐘內，上面的血壓掉
20 以上，或下面的掉 10 以上。

平常這樣做



分段慢慢起身
躺→坐 1-2 分鐘→扶穩站立



依醫囑補充水分
少量多次；炎熱或活動時更留意



避免誘發情境
久站、過熱、酒精、突然彎腰起身



記錄血壓與症狀
依醫囑量躺 / 坐與站立血壓

起身不暈的三個動作

1 起身前先熱身

躺著或坐著先動腳踝、
握拳、繃緊大腿各 10 下

2 分段慢慢起來

躺 → 坐 1-2 分鐘 →
扶著東西再站起來

3 覺得暈就夾緊

雙腿交叉用力夾緊，
或立刻蹲下、坐下

其他有幫助的：穿彈性壓力襪或腹帶；睡覺時把頭部墊高 10~20 公分。

兩個容易被忽略的重點

① 藥物是最常見的原因 —— 降血壓藥、利尿劑、攝護腺藥、安眠藥都可能
帶完整藥單回診請醫師檢視；但絕對不可自行停藥或減量。

② 躺著時血壓反而可能偏高 —— 不要躺著吃降血壓藥；睡覺時頭部墊高有幫助。